

# МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

## ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ:


**Потреблять достаточное количество кальция и витамина D в течение всей жизни.**

**Источники кальция в пище:**

- 100 г нежирных молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт, мороженное, творог) содержат 100-120 мг кальция;
- 100 г твёрдого сыра могут содержать до 1000 мг кальция;
- кальций также содержится в шпинате, брокколи, рыбных консервах с костями и продуктах, обогащённых кальцием (апельсиновый сок, каши – если указано, что продукт обогащён кальцием).




**Витамин D играет важную роль для усвоения кальция и здоровья костей и мышц. У молодых людей витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Достаточно гулять 15-30 минут с открытым лицом и кистями, чтобы получить адекватный уровень витамина D. Однако, у пожилых людей возможности кожи синтезировать витамин D снижаются.**




# В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ СПОРТОМ:

**Физические упражнения, которые выполняются на ногах (ходьба, бег, теннис, танцы, занятия на тренажёрах) благоприятны для лучшего набора пика костной массы и улучшения качества кости у молодых людей. Эти упражнения менее эффективны у женщин в постменопаузе для увеличения костной массы. Вместе с тем, упражнения, направленные на увеличение мышечной массы и улучшение равновесия благоприятны для предупреждения падений.**



**ИСТОЩАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ  
НАГРУЗКИ, НАПРОТИВ, МОГУТ  
ПРИВОДИТЬ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ  
ПОТЕРЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТИ.**



## **ИЗБЕГАТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (КУРЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ):**

**Курение негативно влияет на кости. Курящие женщины имеют более низкий уровень эстрогенов, раньше вступают в климакс. Курение влечёт худшее усвоение кальция из продуктов питания. Люди, которые выкуривают пачку сигарет ежедневно обычно имеют на 5-10% меньше костной массы к 50 годам, по сравнению с некурящими.**



**Злоупотребление алкоголем (более 2-3 установленных единиц алкоголя ежедневно, регулярно - соответствует стандартному бокалу пива (285 мл), одной стандартной порции крепкого спиртного (30 мл), бокалу вина средних размеров (120 мл) или одной порции аперитива (60 мл) приводит к снижению костной плотности даже у молодых мужчин и женщин. Алкоголизм увеличивает риск переломов из-за потери костной массы, недостатка питательных веществ и увеличению частоты падений.**

